

TRATTAMENTO AD AZIONE CHERATOLITICA DELLE FORME DI PRECANCEROSI CUTANEE (AK) IPERCHERATOSICHE TRATTAMENTO ESFOLIANTE NEI CASI DI AK



Crema Trattamento

Forme ipercheratosiche

50 ml

DISPOSITIVO MEDICO CE 0051

INDICAZIONI

Trattamento ad azione cheratolitica delle forme di precancerosi cutanee (cheratosi attiniche) ipercheratosiche trattamento ad azione esfoliante nei casi di cheratosi attiniche (AK).

AZIONE

Kerà K2 riduce l'ipercheratosi ripristinando così i fisiologici meccanismi di cheratinizzazione e rigenerazione cellulare. Kerà K2 è quindi utile per prevenire l'insorgenza di carcinoma squamocellulare (SCC), modificando l'atopia cellulare del DNA indotta dai raggi ultravioletti.

MODO D'USO

La crema deve essere applicata sulla zona interessata in strato sottile una volta al giorno, preferibilmente la sera. Proseguire con il trattamento fino alla riduzione della sintomatologia o secondo indicazione del medico. Quando si applica la crema si può percepire una sensazione di leggero pizzicore che sparisce in poco tempo.

INGREDIENTI

Aqua, Urea, Hydrogenated Polydecene, Dicaprylyl Ether, Squalane, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Shorea Stenoptera Seed Butter, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Tocopherol, Octatrienoic Acid, Allantoin, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Lactic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Sodium Hydroxide, Caprylic/Capric Triglyceride.

BREVETTI / EP2560632 - WO2015033276 - 0001394921 (ACIDO OCTATRIENOICO)

R I C E R C A D E R M A T O L O G I C A 